

DESTRUCTEUR COUVERT VEGETAL SEMÉ					CULTURES AVANT / APRÈS LE COUVERT					Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre															
Ferme des Années					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Couvert d'hiver	Seigle / Vesce / Phacélie / Féverole	Passage au rotovator avant le semis à la volée le sol se compacte rapidement et aide à l'enfoncement des graines	Passage au rotovator et cultivateur + semis à la volée	Broyeur à marteaux + bâchage																					COURGES SUR BÂCHE																
Couvert permanent	Trèfle Blanc	Garder les écarts entre les rangs de choux = erreur car pas de place pour passer la tondeuse ; il ne faut faire qu'un seul rang pour passer la tondeuse	A la volée, très dense : gagnant en rapidité	Tonte lors de l'entretien du couvert	COUVERT PERMANENT					TOMATES																															
Couvert d'été	Moutarde / Phacélie / Sarrasin / Féverole	Seulement un seul couvert d'été réalisé / Passage au rotovator aussi avant le semis à la volée car le sol se compacte rapidement et aide à l'enfoncement des graines	Passage au rotovator + semis à la volée	Broyeur à marteaux + bâchage						OIGNONS															COUVERT D'ÉTÉ																
Ferme Alternative																				COURGES																					
Le Potager Nature (message envoyé)																				HARICOTS / PETITS POIS																					
Couvert d'hiver	Seigle fourrager d'hiver	Pas de renseignements	Semoir Earthway pour plus de précision et pratique pour les petites surfaces mais prend du temps	Broyeur taarup : Si le couvert est trop haut, la destruction est plus compliquée avec le matériel disponible + bâchage																POMMES DE TERRE / OIGNON / ECHAULTES					COUVERT D'ÉTÉ																
Couvert d'été	Tournesol d'été pur	Pas de renseignements																																							
La Petite Surface (message envoyé)																				COURGETTE BACHÉE																					
Couvert d'hiver	Seigle fourrager d'hiver / Vesce commune d'hiver	Pas de renseignements	Semoir JP1 avec disque haricot	Couchage + bâchage																																					
Couvert de printemps	Moutarde de printemps / Avoine de printemps / Vesce commune de printemps / Phacélie de printemps	Pas de renseignements	Semoir JP1 + à la volée : Résultat trop dense et compliqué avec les choix des disques avec le semoir donc sécurisation du semis à la volée juste après	Broyage + bâchage																																					
La Ferme des Rufaux										OIGNON BOTTE															COUVERT D'HIVER																
Couvert d'été	Phacélie / trèfle d'alexandrie / Phacélie / Trèfle Incarnat	Densification les couverts (semis de fortes densités) permet de favoriser la destruction en ayant des pieds qui se concurrencent plus entre eux	Passage d'un canadien (5 dents) pour faire un lit de semence après un débâchage d'une toile tissée de 130gr/m² + semis à la volée	Phacélie détruire par le gel / Broyage + bâchage																COURGES																					
Couvert d'automne	Moutarde	Pas de renseignements	Semis à la volée réalisé au fur et à mesure de la récolte	Broyage + bâchage pendant environ 2 mois						PDT NOUVELLES SUR PAILLE															COUVERT D'AUTOMNE																
Les Gobettes										CAROTTES / MESCLUN										COUVERT D'ÉTÉ					COUC OCCU																
Les Légumes du p'tit Vattetot										OIGNONS SOUS PAILLE										COUVERT D'HIVER																					
Couvert d'hiver	Mélange de 16 espèces mellifères	Pas de renseignements	Semis à la volée: Épandage d'une fine couche de compost après le semis pour couvrir la graine	Broyage assez haut car présence d'animaux et d'insectes en surface + bâchage																																					
Couvert d'été	Mélange de 16 espèces mellifères	Pas de renseignements		Tiens tout l'été						CAROTTES PRIMEURS															COUVERT D'ÉTÉ																
Les Radis de Vassy										POMMES DE TERRE / OIGNONS															COUVERT D'AUTOMNE																
Couvert d'hiver	Seigle fourrager d'hiver / Petits pois	Pas de renseignements	Semoir ebra de 1930 / semoir planet junior de 1919 : Préférence des lignes par le semoir que le semis à la volée	Couchage + bâchage																																					
Couvert d'été	Seigle fourrager d'hiver, féverole, vesce vellue, pois fourrager	Pois fourrager ne passe pas très bien l'hiver Destruction stade début éplaison pour le seigle, la féverole est à peine fleurie		Broyeur à couteau filéau + rotovator + cultibatte à dents + outil animé juste avant plantation																					COURGES SUR BÂCHE																
Couvert d'hiver	Seigle fourrager d'hiver/moutarde blanche, féverole, vesce vellue, pois fourrager	Seigle produit beaucoup de tiges qui peuvent être gênantes pour la culture suivante Possibilité de remplacer le seigle par la moutarde La moutarde parvient à passer l'hiver en Bretagne Destruction précoce : biomasse plus faible et pas si peu moins bien structurée mais moins de résidus lignéux après destruction																							COURGES SUR BÂCHE																
Ferme Espérance										COURGES SUR BÂCHE																															
Couvert d'hiver	Seigle fourrager d'hiver / Vesce Commune d'hiver	Modalité 1 : 2,7 kg/surface de Seigle fourrager d'hiver / 1,5 kg/surface de Vesce Commune d'hiver ; Modalité 2 : 1,35 kg/surface de Seigle fourrager d'hiver / 0,75 kg/surface de Vesce Commune d'hiver	Semis à la volée sur 1/2 de la surface avec la modalité 1 / Semis à la roue semeuse sur 1/2 de la surface avec la modalité 2	Pas de renseignements																					COURGES SUR BÂCHE																

